

SCHEDA N° 0080 AMS_PD

ORDINE Amanitales

GENERE Amanita	SPECIE gracilior	AUTORE Bas & Honrubia	
DATA DI RACCOLTA 12.11.2011	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S.Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<input type="text" value="BOSCO DI: Latifolia (prevalentemente Leccio)"/>		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI <input type="text"/>

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti esemplari isolati, seppure spesso non molto distanti tra loro.

MICROSCOPIA: Spore strettamente ellittiche, con apicolo; 10.0-11.8 x 5.4-6.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : GALLI R. - LE AMANITE - A.G.C. (MI)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORI



SPORE



BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da emisferico a piano-depresso, di c.a. 8-10 cm. di diametro negli esemplari più grandi; cuticola asciutta e satinata, di colore biancastro, cosparsa da verruche piramidali di dimensioni contenute, più fitte al centro.

Lamelle libere, attenuate al gambo, di colore bianco-crema con sfumature rosa-incarnato.

Stipite robusto, cilindrico ma decisamente allargato alla base, con bulbo turbinato-napiforme; anello fioccoso, di consistenza cremosa; volva indistinta e friabile in residui fioccosi disseminati nella regione basale.

Microscopia. Spore strettamente ellittiche, spesso quasi cilindriche, con apicolo, di 10.0-11.8 x 5.4-6.8 μ ; basidi tetrasporici, di 40-45 x 10-12 μ .