

**SCHEDA N° 0191 AMS\_PD**

**ORDINE Agaricales**

GENERE <b>Coprinus</b>	SPECIE <b>truncorum</b>	AUTORE (Scop. : Fr.) Fries	
DATA DI RACCOLTA <b>04.04.2014</b>	LUOGO DI RACC. <b>Parco cittadino</b>	COMUNE <b>Selvazzano</b>	PROV. <b>PD</b>
ALTITUDINE S.L.M. <b>15 m</b>	I.G.M. <b>0126-IV</b>	RACCOGLITORE <b>Nadia Oprandi</b>	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input checked="" type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA     OMBROSA     MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO     MOLTO UMIDO     UMIDO     ASCIUTTO     SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :**


**NOTE :** Rinvenuti 6 esemplari appressati, su legno interrato.

**MICROSCOPIA:** Spore da ellissoidali ad amigdaliformi, con poro germinativo arrotondato, di 7.2-8.6 x 4.8-5.7 µ.

**BIBLIOGRAFIA :** CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2) – A.M.B. (TRENTO)

**DETERMINATORE** Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI  SECCHI



**CARPOFORI**



**SPORE**



**EPICUTE (VELO)**



**PELISTIPITE**

#### DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** da campanulato a conico, di c.a. 2.5 cm. negli esemplari più grandi; scanalato per lungo tratto e ricoperto di fiocchi biancastri.

**Lamelle** sub-libere, nerastre (fungo maturo) con riflessi lilla-violacei e filo intero biancastro.

**Microscopia.** Spore da ellissoidali ad amigdaliformi, con poro germinativo centrale e arrotondato, di 7.2-8.6 x 4.8-5.7  $\mu$ ; nell'epicute e nel velo osservate cellule globose e cilindriche; presenza di peli nella regione basale (prevalentemente) dello stipite.