

SCHEDA N° 0079 AMS\_PD

ORDINE Pezizales

GENERE <i>Disciotis</i>	SPECIE <i>venosa</i>	AUTORE (Pers.:Fr.) Arnaud	
DATA DI RACCOLTA 06.04.2011	LUOGO DI RACC. Parco cittadino	COMUNE Padova	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Giorgio De Faccio	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input checked="" type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE :

**MICROSCOPIA:** Spore ellissoidali, lisce, ialine, a parete spessa; 20.0-21.5 x 11.5-13.0 micron. Aschi non-amiloidi.

**BIBLIOGRAFIA :** MEDARDI G. - 2006 - ATL. FOTOGRAFICO DEGLI ASCOMICETI D'ITALIA - A.M.B. (TN)  
BREITENBACH J., KRANZLIN F. - 1984 - FUNGI OF SWITZERLAND (1) - EDITION MYKOLOGIA (LUCERNA)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI  SECCHI



CARPOFORI



SPORE



ASCHI



PARAFISI



GUTTULE APICALI

#### DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Ascoma** in forma di apotecio brevemente stipitato, da discoidale a cupolato, di c.a. 9 cm. di diametro nell'esemplare più grande; imenoforo liscio di colore bruno-nocciola con zonature più chiare, caratterizzato da numerose costolature/rilevature radiali orientate dal centro verso l'orlo; superficie esterna bianco-ocrea con nervature (in negativo) corrispondenti alle costolature interne; regione prossima all'orlo ornata da punteggiature di colore ocra.

**Carne** elastica ma cassante, biancastra, in un esemplare con evidente (seppure tenue) odore di cloro.

**Microscopia.** Spore ellissoidali, lisce, non amiloidi, a parete spessa, di 20.0-21.5 x 11.5-13.0  $\mu$ , caratterizzate da diffuse e piccole guttule sia interne che esterne (quest'ultime in posizione apicale), uniseriate nell'asco; aschi otto-sporigi, cilindracei; parafisi cilindracee, con apice allargato.