

SCHEDA N° 0070 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|
| GENERE <i>Pholiota</i> | SPECIE <i>flammans</i> | AUTORE (Batsch:Fr.) Kummer | |
| DATA DI RACCOLTA 13.08.2011 | LUOGO DI RACC. San Vigilio | COMUNE Castelrotto | PROV. BZ |
| ALTITUDINE S.L.M. 1050 m | I.G.M. 027-I | RACCOGLITORE Vitaliano Milanese | |

HABITAT:

| | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PRATIERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: Misto di latifolia e Abete Rosso | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO | DI Abete rosso |

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :


NOTE : Rinvenuto un gruppetto di esemplari subcesposi.

MICROSCOPIA: Spore cilindrico- ellissoidali; 3,9-4,6 x 2,5-2,7 μ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B. (TN)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo emisferico a bordo ricurvo, di c.a. 3 cm. di diametro nell'esemplare più grande, cuticola giallo limone, con squamule irsute giallognole; lamelle adnato-decorrenti, giallastre.

Stipite slanciato e sinuoso, squamuloso, di colore giallo-limone chiaro.

Microscopia. Spore cilindrico-ellissoidali, bruno-giallastre al MS.; 3.9-4.6 x 2.5-2.7 μ .