

SCHEDA N° 0026 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE callisteus	AUTORE (Fr.:Fr.) Fries	
DATA DI RACCOLTA 04.09.2010	LUOGO DI RACC. Auronzo di Cadore	COMUNE Auronzo	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 030-IV	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> RADO
<input type="checkbox"/> BOSCO DI: Abete rosso (prevalente) misto a Faggio.		<input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO	<input type="checkbox"/> MORTO

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :



NOTE : **Marcato odore di lamiera surriscaldata.**

MICROSCOPIA: **Spore ovoidali, 7.2-7.6 x 5.7-6.5 micron; fittamente verrucose.**

BIBLIOGRAFIA : **CONSIGLIO G., PAPETTI C. - 2001 - ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2) - A.M.B. (TN)**

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p>CARPOFORI</p>	 <p>SPORE</p>	

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da ottusamente campanulato ad appianato-convesso con diametro di c.a. 5 cm., caratterizzato da margine involuto e leggermente ondulato; cuticola non igrofana, di colore giallo zafferano ma ricoperta da una fine squamulosità bruno-rossastra.

Lamelle adnato decorrenti con dentino, piuttosto spaziate, ondulate con filo intero, poi leggermente eroso; di colore giallo zafferano, quindi ruggine per maturazione sporale.

Stipite cilindraceo con allargamento bulboso alla base; concolore al cappello, più scuro nella parte basale e ricoperto da fibrille longitudinali rossicce e da tracce bruno-rossastre del velo generale.

Carne giallastra nella parte superiore e bruno-arancio in quella inferiore; odore tipico di lamiera surriscaldata.

Microscopia. Spore ovoidali di c.a. 7.2-7.6 x 5.7-6.5 μ , dotate di fitta ornamentazione verrucosa, di colore giallo-brunastro al microscopio (acqua e ammoniaca).