

SCHEDA N° 0014 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE vernus	AUTORE Lindstr. & Melot	
DATA DI RACCOLTA 10.04.2010	LUOGO DI RACC. Cavallino	COMUNE Jesolo	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 128-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input checked="" type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
BOSCO DI :		<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Due gruppi di 10-12 esemplari ciascuno, molto ravvicinati, in spianata erbosa di un parco con latifoglie.

MICROSCOPIA: Spore largamente ellissoidali (tal. citriformi), verrucose; 7.5-8.2 x 5.0-5.6 micron.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. - 1984 - FUNGI OF SWITZERLAND (5) - EDITION MYKOLOGIA (LUCERNA)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORI



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo di c.a. 3 cm. di diametro negli esemplari più grandi, da emisferico a conico-campanulato, con ampio umbone, a margine sottile brevemente fessurato in modo uniforme nei carpofori adulti; superficie liscia e opaca, di colore bruno-rossiccio (tempo asciutto), più carico nella zona discale e sbiadente nell'estrema regione perimetrale.

Lamelle non molto fitte, da largamente annesse a subdecorrenti con dentino, intercalate a lamellule (da 1 a 4 per ogni interspazio lamellare), di colore inizialmente ocraceo, quindi bruno-ruggine, con filo chiaro.

Gambo cilindraceo, esile, leggermente ingrossato nella parte inferiore; superficie esterna opaca, di colore bruno chiaro e sfondo debolmente violetto nel terzo inferiore, percorso da striature longitudinali biancastre.

Carne biancastra, ma bruno scura sotto la cuticola e nella regione sovra-lamellare.

Microscopia. Spore largamente ellissoidali, talora citriformi, verrucose, di 7.5-8.2 x 5.0-5.6 μ , Q = 1.38-1.6, brunastre. Basidi clavati tetrasporici.