

**SCHEDA N° 0302 AMS\_PD**

**ORDINE Tricholomatales**

|                             |                              |                                 |          |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|
| GENERE <i>Clitocybe</i>     | SPECIE <i>gibba</i>          | AUTORE (Pers.) P. Kumm.         |          |
| DATA DI RACCOLTA 21.07.2012 | LUOGO DI RACC. Val di Fiemme | COMUNE Predazzo                 | PROV. TN |
| ALTITUDINE S.L.M. 1100 m    | I.G.M. 044-I                 | RACCOGLITORE Vitaliano Milanese |          |

**HABITAT:**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATERBOSI                 | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI                     | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                              |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO               | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO                    | <input type="checkbox"/> ARENILE  |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                   | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |   |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME            | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                                |
| BOSCO DI: <i>Abete rosso (prevalente)</i>           |  | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO                | <input type="checkbox"/> IN RADURE                                      |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                   | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI  |

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA       OMBROSA       MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO     MOLTO UMIDO     UMIDO     ASCIUTTO     SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : *Abete rosso.*




NOTE : Rinvenuti numerosi gruppetti di 2-3 esemplari ciascuno.

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a lacrimoidi, lisce, di 5.2-6.9 x 3.8-4.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (3) – LUCERNA

DETERMINATORE *Vitaliano Milanese*

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI     FRESCHI     SECCHI

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p style="text-align: center;"><b>CARPOFORI</b></p> |  <p style="text-align: center;"><b>SPORE</b></p> |  <p style="text-align: center;"><b>BASIDI E BASIDIOLI</b></p> |
|   |  |  |

#### DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** da depresso a imbutiforme, di c.a. 3-4 cm, in qualche caso con piccolo umbone; superficie finemente feltrata, opaca, di colore ocraceo pallido, non igrofana; margine un po' involuto.

**Lamelle** piuttosto fitte, decorrenti; biancastre con sfumature appena gialline.

**Stipite** cilindrico, ma allargato alla base; con colore alle lamelle; dotato di tomento basale biancastro; carne di consistenza tenace.

**Microscopia.** Spore da ellissoidali a lacrimoidi, ialine, lisce, di 5.2-(6.09)-6.9 x 3.8-(4.36)-4.8  $\mu$ , con Q: 1.3-(1.39)-1.57; basidi lungamente clavati, tetrasporici, 24.0-30.8 x 5.7-6.5  $\mu$ .