

SCHEDA N° 0310 AMS_PD

ORDINE Boletales

GENERE <i>Xerocomus</i>	SPECIE <i>subtomentosus</i>	AUTORE (L.) QuéL.	
DATA DI RACCOLTA 31.10.2015	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S. Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1.5 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Latifolia (nettamente prevalente)		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUETRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **Leccio, Carpino, Frassino.**

NOTE : **Rinvenute due stazioni di 3-5 esemplari ciascuna.**

MICROSCOPIA: **Spore ellittico-subfusiformi, con depressione periapicolare, 12.3-14.1 x 4.9-6.1 μ.**

BIBLIOGRAFIA : **GALLI R. - I BOLETI - ED. DALLA NATURA**

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORI



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo pulvinato, di c.a. 5-6 cm di diametro nell'esemplare maggiore rinvenuto; cuticola asciutta, screpolata, finemente vellutata, di colore bruno-rossastro.

Tuboli adnati o un po' decorrenti; pori piuttosto grandi e angolosi, giallastri, viranti all'azzurro quando toccati.

Stipite cilindrico, talora ovalizzato all'apice, per lo più ricurvo alla base; di colore giallastro, ricoperto da fini granulazioni, sfumato di bruno-rossastro nella parte superiore.

Carne da soda a molliccia; giallina, virante lentamente all'azzurro quando esposta all'aria.

Microscopia. Spore ellittico-subfusiformi, lisce, con depressione periapicale, 12.3-(13.19)-14.1 x 4.9-(5.59)-6.1 μ , Q: 2.17-(2.36)-2.47.