

SCHEDA N° 0314 AMS_PD

ORDINE Boletales

GENERE Boletus	SPECIE fechtneri	AUTORE Velen.	
DATA DI RACCOLTA 19.08.2015	LUOGO DI RACC. Strine	COMUNE Tonadico	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1400 m	I.G.M. 062-I	RACCOLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

<input checked="" type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Misto		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **Abete rosso e Noccioli**

NOTE : **Rinvenuto sotto un Faggio.**

MICROSCOPIA: **Spore ellissoidali con depressione preapicale, 9.2-11.8 x 4.7-5.6 μ,**


BIBLIOGRAFIA :

DETERMINATORE **Franco Manganelli**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORI



SPORE



BASIDIO

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 6-7 cm. di diametro; bruno-chiaro, quasi feltrato (lente), butterato con orlo leggermente involuto; convesso.

Imenio a tubuli alti circa 5-6 mm., molto sottili, gialli; così pure i pori, piccolissimi e gialli; adnati al gambo.

Gambo cilindrico, allargato alla base, giallo con reticolo (almeno in alto) molto fitto e concolore; presenta nella parte centro-basale una sfumatura rosata (non dappertutto).

Carne soda, giallastra, bruno rossiccia sotto la cuticola, virante all'azzurro chiaro nel cappello e rosata alla base del gambo; sapore acidulo-fruttato.

Microscopia. Spore ellissoidali con depressione preapicale (non sempre ben visibile), di 9.2-11.8 x 4.7-5.6 μ ; basidi clavati, tetrasporici, fino a 37 x 12 μ .