

SCHEDA N° 0321 AMS\_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Tricholoma</i>	SPECIE <i>fracticum</i>	AUTORE (Britzelm.) Kriese	
DATA DI RACCOLTA 03.11.2015	LUOGO DI RACC. Sabbionara	COMUNE Cloz	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 950 m	I.G.M. 026-III	RACCOLITORE Giorgio Bortoletto	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Pino nero		<input type="checkbox"/> RADO <input checked="" type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE :

MICROSCOPIA: Spore ellittico-ovoidali, lisce, guttulate, 4,4-5,5 x 3,3-4,2 µ.


BIBLIOGRAFIA : GALLI R. - I TRICOLOMI - DALLA NATURA

DETERMINATORE Giorgio Bortoletto

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI  SECCHI



CARPOFORI



SPORE



BASIDI

#### DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** spianato, con umbone ottuso poco pronunciato, di c.a. 9 cm nell'esemplare maggiore; cuticola asciutta e opaca (tempo secco, esemplari anziani), di colore bruno-rossastro, più scura al centro; margine ondulato.

**Lamelle** smarginate, fitte, sinuose, intercalate a lamellule; da biancastre a crema-beige-rosato, macchiate di bruno specie sul filo.

**Stipite** cilindrico, piuttosto robusto, un po' curvo e attenuato alla base; subconcolore al cappello nella parte subanulare, biancastro e puntinato al di sopra della stessa; zona anulare rilevata.

**Microscopia.** Spore ellittico-ovoidali, lisce, guttulate, brevemente apicolate, di 4.4-(4.83)-5.5 x 3.3-(3.65)-4.2  $\mu$ , con Q: 1.19-1.44; basidi tetrasporici, cilindrico-clavati, con sterigmi molto lunghi, 27.0-37.0 x 5.2-7.4  $\mu$ .