

SCHEDA N° 0354 AMS_PD

ORDINE Boletales

GENERE Boletus	SPECIE rubrosanguineus	AUTORE Cheype	
DATA DI RACCOLTA 28.06.2016	LUOGO DI RACC. Bosco	COMUNE Casez	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 800 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
BOSCO DI: Abete sp. (prevalente)		<input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> SU LEGNO
<input type="checkbox"/> VIVO	<input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Rinvenuti tre esemplari isolati.**

MICROSCOPIA: **Spore da lungamente ellissoidali a fusiformi, guttulate, 12.5-15.0 x 5.1-6.2 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **GALLI R. - I BOLETI - ED. DALLA NATURA**

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p style="text-align: center;">CARPOFORI</p>	 <p style="text-align: center;">SPORE</p>	 <p style="text-align: center;">BASIDI - BASIDIOLI</p>

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo piano-convesso (funghi adulti), di c.a. 9 cm. di diametro nell'esemplare più grande; cuticola asciutta, leggermente tomentosa (per larga parte quasi aureolata nella zona centrale), eccedente al margine, di colore uniforme bruno-rosso cupo.

Imenoforo con tuboli subliberi (funghi adulti), sottili, di colore giallo-verdastro azzurranti al taglio; pori da giallo arancio, progressivamente rosso sangue in modo uniforme, azzurro-blu alla pressione.

Stipite piuttosto robusto, subclavato; di colore rosso sangue uniforme; reticolo molto fine, a maglie strette, esteso a tutto il gambo e ad esso concolore.

Carne soda (leggermente fibrosa); di colore giallo pallido, ma rosso scuro alla base; viraggio uniforme all'azzurro-blu sull'intera superficie per esposizione all'aria.

Microscopia. Spore da lungamente ellissoidali a fusiformi, con depressione preapicale (in vista laterale), a parete spessa, guttulate, di 12.5-(14.02)-15.0 x 5.1-(5.61)-6.2 μ , con Q: 2.29-(2.74)-2.79; basidi tetrasporici, clavati, 28.5-36.0 x 9.0-12.0 μ .