

SCHEDA N° 0351 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Collybia</i>	SPECIE <i>ocior</i>	AUTORE (Pers.) Vilgalys & O.K. Mill.	
DATA DI RACCOLTA 14.06.2016	LUOGO DI RACC. Arnica	COMUNE Castelfondo	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1500 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> RADO
<input type="checkbox"/> FITTO		
BOSCO DI: <input type="checkbox"/> Misto con prevalenza di aghifoglia.		
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO	<input checked="" type="checkbox"/> MORTO
DI <input type="checkbox"/> (presunta) aghifoglia		

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :


NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari su ceppaia lungo una strada forestale.

MICROSCOPIA: Spore da ellittiche a larmiformi, lisce, ialine, 4.4-6.2 x 2.7-3.4 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2) – A.M.B.

DETERMINATORE Giorgio Bortoletto

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo appianato, con leggera depressione centrale, di c.a. 4 cm di diametro negli esemplari più grandi; cuticola liscia, igrofana, di colore giallo-brunastro; margine sottile, ondulato, con tonalità gialla.

Lamelle fitte, adnato-smarginate, subventricose, di colore giallo; presenti numerose lamellule.

Stipite cilindrico, liscio, di colore giallo pallido con sfumature ocracee (in particolare verso la base).

Microscopia. Spore da ellittiche a larmiformi, con guttule (non sempre evidenti), lisce, ialine, di 4.4-(5.3)-6.2 x 2.7-(3.0)-3.4 μ , con Q: 1.38-2.10; basidi tetrasporici, cilindrico-clavati, dotati di GaF, 19.0-23.0 x 5.2-6.4 μ ; epicute a struttura corallina con ife cilindriche.