

SCHEDA N° 0371 AMS\_PD

ORDINE Entolomatales

GENERE <i>Entoloma</i>	SPECIE <i>sinuatum</i>	AUTORE (Bull.) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 16.11.2016	LUOGO DI RACC. Oasi di Rubano	COMUNE Rubano	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 15 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATIERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO      DI	

ESPOSIZIONE:       ASSOLATA       OMBROSA       MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO       ACQUITRINOSO       MOLTO UMIDO       UMIDO       ASCIUTTO       SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Quercia (prevalente), Carpino e Robinia.

NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari tra l'edera su terreno argilloso.

MICROSCOPIA: Spore poligonali, subisodiametriche, (5)-6 lati, 8.4-10.3 x 7.3-8.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : NOORDELOOS M. E. - ENTOLOMA - FUNGI EUROPAEI  
BREITENBACH J., KRANZLIN F. - FUNGI OF SWITZERLAND (4) - MYCOLOGIA

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI       FRESCHI       SECCHI



CARPOFORI



SPORE



BASIDI



TERMINALI

#### DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** da convesso ad appianato, da 6 a 12 cm (nell'esemplare più grande) di diametro, con margine sottile, inizialmente involuto; cuticola grigio-brunastra, percorsa da fibrille radiali sericee.

**Lamelle** smarginate, intercalate a lamellule piuttosto lunghe, da arcuate a ventricose; colore iniziale (negli esemplari giovani) bianco-giallino, successivamente rosa-ocraceo; filo lamellare per lo più seghettato.

**Stipite** cilindrico, molto slanciato (cappello affiorante da uno spesso strato di edera), flessuoso; superficie di colore biancastro, percorso da fibrille longitudinali sericee.

**Carne** biancastra, con odore farinoso.

**Microscopia.** Spore poligonali, subisodiametriche, a (5)-6 lati, di 8.4-(9.07)-10.3 x 7.3-(7.86)-8.6  $\mu$ , Q: 1.1-(1.15)-1.26; basidi clavati, tetrasporici, dotati di GaF, 33.0-37.0 x 8.0-10.0  $\mu$ ; elementi terminali cilindrici, capitulati. Sporata rosa-brunastra.