

SCHEDA N° 0384 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE <i>Cortinarius</i>	SPECIE <i>lividoviolaceus</i>	AUTORE Rob. Henry	
DATA DI RACCOLTA 16.11.2016	LUOGO DI RACC. Bosco di Rubano	COMUNE Rubano	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 15 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: <i>Quercia sp.</i>		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti sei esemplari sotto Farnia.

MICROSCOPIA: Spore da amigdaliformi a subcitriformi, finemente verrucose, 9.6-11.4 x 5.8-6.6 μ.

BIBLIOGRAFIA : MOSER M. – GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DEI FUNGHI - SATURNIA

DETERMINATORE Vitaliano Milanese


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORI



SPORE



BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da emisferico a piano-convesso, di c.a. 5 cm di diametro negli esemplari adulti; cuticola asciutta (tempo secco), radialmente fibrillosa, di colore bruno-rossastro, più chiara al margine negli esemplari più giovani dove appare talora con vaghe sfumature lilla; margine involuto, connesso al gambo da resti di velo azzurrini.

Lamelle subadnato, intercalate a lamellule, di colore lilla, quindi lilla-ocracee; filo lamellare finemente eroso, concolore.

Stipite cilindrico, slanciato, in taluni esemplari un po' clavato nella regione basale; colore iniziale lilla-violetto uniforme, quindi schiarentesi nella metà inferiore e, comunque, con sempre più estese zone bruno-rossastre.

Carne compatta, all'inizio uniformemente lilla, quindi decoloratesi con salvaguardia della regione subpileale e della zona centrale dello stipite; odore intenso, non sgradevole.

Microscopia. Spore da amigdaliformi a subcitriformi, finemente verrucose, di 9.6-(10.43)-11.4 x 5.8-(6.23)-6.6 μ , con Q: 1.50-(1.68)-1.91; basidi clavati, tetrasporici, 32.0-34.0 x 8.5-10.0 μ .