FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0106 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Hypholoma	SPECIE sublateritium	AUTORE (Fries) Quélet	
DATA DI RACCOLTA 28.08.2007	LUOGO DI RACC. Castelrotto	COMUNE Castelrotto	PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1100 m	I.G.M. 027-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : Misto di latifoglia e Abete rosso. ☒ RADO ☐ FITTO

☐ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☒ SU LEGNO ☐ VIVO ☒ MORTO DI Nocciolo

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti alcuni esemplari fascicolati su detriti legnosi interrati.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali; 6.0-6.8 x 3.8-4.0 micron.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B. (TRENTO)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORO



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo nell'esemplare maggiore rinvenuto di c.a. 4.5 cm di diametro, convesso con ampio ambone ottuso, di colore rosso aranciato, decoloratesi verso il bordo.

Lamelle arrotondato-adnate, di colore giallo-verdastro pallido.

Stipite cilindraceo, incurvato alla base; colore giallastro, più carico nella parte inferiore.

Microscopia. Spore ellissoidali, con poro germinativo poco distinto; 6.0-6.8 x 3.8-4.0 µ.