FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0022 AMS_PD

ORDINE Agaricales

GENERE Inocybe	SPECIE cincinnata var. major	AUTORE (S.Petersen) Kuyper 1989	
DATA DI RACCOLTA 30.10.2010	LUOGO DI RACC. Parco cittadino	COMUNE Ponte San Nicolò	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 5 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Gianluca Donà	

HABITAT:

- ☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA
- ☒ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE
- ☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A
- ☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ BOSCO SUBALPINO
- BOSCO DI : Carpino e Farnia. ☒ RADO ☐ FITTO
- ☒ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE
- ☐ SU LEGNO ☐ VIVO ☐ MORTO DI

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Terreno tra gli alberi a tratti nudo con zone più o meno erbose.

NOTE : Piccolo bosco tra abitazioni della prima periferia di Padova.

MICROSCOPIA: Spore amigd. con apice ottuso, mis. 10.22-8.15 x 5.80-4.62 micron; cistidi mis. 63-55 x 10-21 (26) micron.

BIBLIOGRAFIA: STANGL J. – GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DEI FUNGHI, VOL. 3
FERRARI E. – INOCYBE ALPINE E SUBALPINE
BON – DOCUMENTS MYCOLOGICUES TOME XXVII FASCICULE N. 108 12/1997
REBAUDENGO - ICONOGRAPHIA MYCOLOGICA VOL. XXIX SUPPLEMENTUM III TABULAE

DETERMINATORE Gianluca Donà

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI



CISTIDIO



CISTIDIO



CAULOCISTIDI SOMMITÀ STIPITE



PARACISTIDI CORTI SUBSFERICI



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Inocybe di piccole dimensioni.

Pileo convesso-emisferico, con superficie cigliato-squamulosa bruno-rossastra, zona discale areolata con squame bruno scuro appressate che lasciano vedere nella parte sottostante la cuticola di colore ocra-biancastro.

Lamelle fitte, uncinate, ocra-brunastre con macchie rugginose.

Stipite sinuoso, fibrilloso, appena ingrossato alla base, con parte inferiore cigliata, bruno-rossastra concolore al pileo e parte superiore nettamente sfumata di lilla-violetto.

Carne biancastra nella parte superiore del carpoforo, sfumata di lilla nello stipite. Odore da subnullo a appena percettibile acidulo-spermatico.

Microscopia. A livello microscopico si segnala la presenza di caulocistidi nella parte alta dello stipite immediatamente sotto l'inserzione delle lamelle; più in basso, nel primo/terzo, si segnalano rari peli caulocistidiali misti a forme di transizione cistidiformi. Parete dei cistidi imeniali sp. 1-2 micron, ammonio positiva. Analisi microscopiche effettuate in rosso congo ammoniacale.