FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0024 AMS_PD

ORDINE Agaricales

GENERE Marasmius	SPECIE cohaerens	AUTORE (Pers.:Fr.) Quélet	
DATA DI RACCOLTA 10.09.2010	LUOGO DI RACC. Altopiano di Asiago	COMUNE Roana	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 1400 m	I.G.M. 082-II	RACCOGLITORE Gianluca Donà	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A Muschio

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☒ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : Abete rosso. ☐ RADO ☒ FITTO

☒ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☒ SU LEGNO ☐ VIVO ☒ MORTO DI Abete rosso

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Sfagni, muschi, vegetazione di bosco montano subalpino.

NOTE : Su ceppo di Abete rosso ricoperto da muschio.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali spinulose mis. 8.38 x5.04 micron; peli imeniali spiniformi mis. 60-90 x 5-10 micron.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2) – A.M.B. (TN)

DETERMINATORE Gianluca Donà

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI IN HABITAT

SPORA



SPORA



FILO LAMELLARE



FACCIA LAMELLA



PELI BIFORCATI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Carpofori di medie dimensioni per il genere Marasmius, esemplari da isolati a cespitosi.

Pileo emisferico-campanulato con superficie finemente vellutata color nocciola-ocraceo più carico al disco, con piccolo umbone depresso, margine appena striato e ondulato.

Lamelle mediamente fitte, intercalate da lamellule, biancastre, libere al gambo.

Stipite cilindrico, longitudinalmente sinuoso, liscio, lucido laccato, di color biancastro alla sommità fino a bruno-nerastro alla base, passando per toni bruno medio nella parte mediana concolori ai cromatismi pileali.

Carne tenace, inodore.

Microscopia. A livello microscopico si segnalano spore con apicolo evidente, in linea con quanto riportato in bibliografia; i peli spiniformi sono abbondantemente collocati sia sul filo lamellare che sulle facce delle lamelle stesse e possono presentarsi anche biforcati.