FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0242 AMS_PD

ORDINE Helotiales

GENERE Leotia	SPECIE lubrica	AUTORE (Scop.) Pers.	
DATA DI RACCOLTA 07.10.2008	LUOGO DI RACC. Posina	COMUNE Posina	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 600 m	I.G.M. 102-I	RACCOGLITORE Mauro Baldan	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : Latifoglie (prevalenti) miste ad Abete ☒ RADO ☐ FITTO

☒ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☐ SU LEGNO ☐ VIVO ☐ MORTO DI

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuto un gruppetto di 12 esemplari.

MICROSCOPIA: Spore fusiformi, un po' arcuate, settate, di (16.6) 18.5-21.3 x 4.7-6.0 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G, SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B. (TN)
BREITENBACH J., KRANZLIN F. – MUSHROOMS OF SWITZERLAND (1) – ED. MYCOLOGIA (LUCERNA)

DETERMINATORE Mauro Baldan

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

ASCOCARPI



SPORE

PARAFISI

ASCHI



ASCO (DETTAGLIO)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Ascoma costituito da apotecio stipitato, irregolarmente globoso, di colore giallo-olivastro/-bruno verdastro; superficie inferiore liscia, più chiara.

Stipite cilindraceo, leggermente allargato alla base, solcato longitudinalmente; di colore giallo-oliva pallido.

Microscopia. Spore lungamente fusiformi, un po' arcuate, lisce, ialine, con 4-5 setti trasversali, di 16.6-(18.8)-21.3 x 4.7-(5.3)-6.0 µ, con Q: 2.8-(3.9)-4.5, irregolarmente seriate; aschi ottosporici, con dimensioni fino a 145 x 12 µ; parafisi sottili, settate, filiformi, spesso forcate.