FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0249 AMS_PD | **ORDINE Pezizales**

GENERE Smardaea	SPECIE planchonis	AUTORE (Dunal ex Boud.) Korf & Zhuang	
DATA DI RACCOLTA 29.12.2014	LUOGO DI RACC. P.to Caleri	COMUNE Rosolina	PROV. RO
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☒ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : ☐ RADO ☐ FITTO

☐ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☐ SU LEGNO ☐ VIVO ☐ MORTO DI

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Macchia mediterranea

NOTE : Rinvenuta una decina di esemplari in prossimità di un cespuglio di Ginepro.

MICROSCOPIA: Spore sferiche, lisce, di 10.0-11.0 µ di diametro.

BIBLIOGRAFIA : MEDARDI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEGLI ASCOMICETI D'ITALIA – A.M.B.

DETERMINATORE Nadia Oprandi

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI



ASCOMI



SPORE



PARAFISI

ASCO

ASCHI [OPERCOLI]

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Ascoma costituito da apotecio sessile di c.a. 8-9 mm di diametro; imenoforo liscio, di colore viola-nerastro; superficie esterna liscia e con colore; orlo intero regolare, ma in alcuni esemplari fessurato.

Carne viola scura, ceracea, tenace.

Microscopia. Spore sferiche, lisce, di 10.0-11.0 µ di diametro, non guttulate, uniseriate nell'asco; aschi cilindrici, 8-sporici, opercolati, con parte basale piuttosto lunga, non amiloidi; parafisi cilindracee, allargate nella regione apicale.