FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0269 AMS_PD

ORDINE Russulales

GENERE Lactarius	SPECIE pallidus	AUTORE Pers.	
DATA DI RACCOLTA 12.09.2015	LUOGO DI RACC. Val di Sella	COMUNE Borgo Valsugana	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1050 m	I.G.M. 061-III	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : Faggio (nettamente prevalente), Nocciolo e Abete ☒ RADO ☐ FITTO

☒ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☐ SU LEGNO ☐ VIVO ☐ MORTO DI

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Faggio

NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari isolati.

MICROSCOPIA: Spore obovoidi, dotate di verruche unite da creste zebrate a maglia aperta, di 6.0-7.2 x 5.2-6.3 µ.

BIBLIOGRAFIA : KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (6) – MYCOLOGIA

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI



SPORE



BASIDI

CISTIDI



EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da convesso ad appianato, di c.a. 5 cm di diametro negli esemplari maggiori; superficie liscia, un po' vischiosa (umido), di colore crema-carnacino; margine sottile, involuto.

Lamelle adnate o appena decorrenti, con molte lamellule; di colore crema-carnacino, macchiantesi di ruggine.

Stipite cilindrico, concolore al cappello; farcito, poi cavo.

Microscopia. Spore obovoidi, dotate di verruche unite da creste zebrate a maglia aperta, di 6.0-(6.53)-7.2 x 5.2-(5.69)-6.3 µ, con Q: 1.08-(1.14)-1.23; basidi bi e tetrasporici, fino a 42.0 x 12.0 µ; pleurocistidi lungamente fusiformi, sino a 73.0 x 11.0 µ; cheilocistidi simili, ma un po' più esili.