



SCHEDA N° 0355 AMS_PD

ORDINE Boletales

| GENERE Boletus | SPECIE reticulatus | A | UTORE Schaeff. | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| DATA DI RACCOLTA 23.06.2016 | LUOGO DI RACC. Plaz alto | COMUNE | Cloz | Prov. TN |
| ALTITUDINE S.L.M. 950 m | I.G.M. 026-III | RACCOG | LITORE Giorgio Borto | oletto |
| HABITAT: | | | | |
| ☐ PRATI ERBOSI | ORTI E GIARDINI | | MARGINI DI STRADA | |
| TERRENO NUDO | ☐ TERRENO SABBIOSO | | ARENILE | |
| ☐ TORBIERA | ☐ TERRENO COLTIVATO A | | | |
| ARGINE DI FIUME | LUOGO BRUCIATO | | BOSCO SUBALPINO | |
| BOSCO DI: Aghifoglia (nettamen | te prevalente) | | RADO | ☐ FITTO |
| ☐ DENTRO AL BOSCO | ☐ AI MARGINI DEL BOSCO | |] IN RADURE | |
| ☐ SU LEGNO | □ vivo □ morto | DI | | |
| ESPOSIZIONE: | | OMBROSA D | MEDIA | |
| UMIDITA' DEL TERRENO | ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO U | міро 🗌 имі | DO ASCIUTTO | ☐ SECCO |
| VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: | _ negerim.obo _ mobio c | O.M. | | |
| NOTE: Rinvenuti due esemplar | i sotto nocciolo. | | | |
| MICROSCOPIA: Spore lungament | e ellissoidali, con depressione prea | picale, guttulate, | di 12.9-16.8 x 4.2-4.8 | μ. |
| Bibliografia : Galli R. – I Boli | ETI – ED. DALLA NATURA | | | |
| _ | EDI DILEET I WITCH | | | |
| DETERMINATORE Giorgio Bortol | etto | FETTUATI SU REP | ERTI FRESCHI | ⊠ secchi |
| | etto | FETTUATI SU REP | | SECCHI ASIDI |





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo piano-convesso, di c.a. 7 cm. di diametro nell'esemplare maggiore; cuticola asciutta e vellutata (funghi adulti), di colore nocciola scuro; carne sottostante bianca; margine sottile, regolare.

Imenoforo con tuboli arrotondato-adnati, sottili, di colore bianco-giallino; pori concolori; entrambi immutabili al taglio o alla manipolazione.

Stipite piuttosto robusto, cilindrico, in alcuni casi un po' ingrossato alla base; colore nocciola carico (solo leggermente più chiaro della cuticola); reticolo fine, concolore.

Carne inizialmente soda, quindi un po' cedevole, di colore bianco; odore spiccato.

Microscopia. Spore lungamente ellissoidali, con leggera depressione preapicale, a parete spessa, guttulate, di 12.9-(14.51)-16.8 x 4.2-(4.53)-4.8 μ , con Q: 2.82-(3.2)-3.56; basidi clavati, tetrasporici, fino a 45.0 x 15.0 μ .