FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0337 AMS_PD

ORDINE Pluteales

GENERE **Pluteus**	SPECIE **cervinus**	AUTORE **(Schaeff.) P. Kumm.**	
DATA DI RACCOLTA **07.06.2015**	LUOGO DI RACC. **Posina**	COMUNE **Posina**	PROV. **VI**
ALTITUDINE S.L.M. **600 m**	I.G.M. **102-I**	RACCOGLITORE **Vitaliano Milanese**	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : **Latifoglia (prevalenti Carpino e Castagno)** ☒ RADO ☐ FITTO

☐ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☒ SU LEGNO ☐ VIVO ☒ MORTO DI **Latifoglia**

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Rinvenuti 7 esemplari isolati su detriti interrati di legno.**

MICROSCOPIA: **Spore ellissoidali, lisce, di 6.1-7.9 x 4.6-5.7 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **BREITENBACH J., KRANZLIN F. –FUNGI OF SWITZERLAND (4) – LUCERNA**

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI



SPORE



BASIDI



PLEUROCISTIDI

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da convesso-campanulato a disteso, di c.a. 12 cm. di diametro nell'esemplare adulto, dotato di largo umbone; superficie liscia, di colore bruno-bistro, marcatamente più scura al disco e impallidente all'orlo.

Lamelle libere, fitte, larghe e ventricose, con filo irregolare; presenti numerose lamellule; inizialmente biancastre, rosa carnicino con la maturazione.

Stipite cilindrico, attenuato nella parte superiore, allargato e quasi bulboso alla base; di colore biancastro, percorso da piccole fibrille bruno-nerastre.

Carne biancastra, un po' imbrunente sotto la cuticola; fragile nel cappello, piuttosto fibrosa nel gambo; odore non particolarmente significativo.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, di 6.1-(6.85)-7.9 x 4.6-(5.35)-5.7 µ, con Q: 1.2-(1.28)-1.4; basidi cilindrico-clavati, tetrasporici, di 31.8-(34.79)-37.7 x 8.9-(9.1)-9.3 µ; pleurocistidi a parete spessa, tip. tricuspidali, ma anche completamente a-cuspidati, di 71-(73.5)-78 x 13.5-(14.9)-17 µ; cheilocistidi da globosi a piriformi; ife dell'epicute con spessore medio intorno ai 6-8 µ, ma con elementi terminali con misure fino a 140 x 18 µ; pigmentazione bruna; GaF non osservati in nessuna struttura.