

**SCHEDA N° 0349 AMS\_PD**

**ORDINE Thelephorales**

GENERE <b>Sarcodon</b>	SPECIE <b>versipellis</b>	AUTORE (Fr.) <b>Nicol.</b>	
DATA DI RACCOLTA <b>12.08.2016</b>	LUOGO DI RACC. <b>San Vigilio</b>	COMUNE <b>Castelrotto</b>	PROV. <b>BZ</b>
ALTITUDINE S.L.M. <b>850 m</b>	I.G.M. <b>027-I</b>	RACCOGLITORE <b>Vitaliano Milanese</b>	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> RADO
<input type="checkbox"/> BOSCO DI: <b>Pino (predominante) e (saltuario) Castagno</b>		<input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO	<input type="checkbox"/> MORTO

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA       OMBROSA       MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO     MOLTO UMIDO     UMIDO     ASCIUTTO     SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :




**NOTE :** Rinvenuto un gruppo di una decina di esemplari, per lo più fascicolati, lungo un sentiero acquitrinoso.

**MICROSCOPIA:** Spore subglobose, tubercolate, 3,9-4,3 x 3,0-3,3 µ.

**BIBLIOGRAFIA :** BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (2) - LUCERNA

**DETERMINATORE** Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI     FRESCHI     SECCHI

 <p style="text-align: center;"><b>CARPOFORI</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>SPORE</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>BASIDI</b></p>

#### DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

**Pileo** irregolarmente ondulato e lobato, da convesso a piano-depresso; cuticola da finemente tormentosa a fibrillosa, di colore bruno-arancio, margine chiaro ondulato e involuto.

**Spine** di c.a. 5 mm nel fungo maturo, decorrenti in modo regolare sullo stipite; colore iniziale bianco-grigiastro, successivamente bruno-rossastro.

**Stipite** robusto, da cilindrico a ventricoso, spesso profondamente radicante (specie negli esemplari fascicolati); concolore al pileo.

**Carne** biancastra, un po' ingrignente; sapore amarognolo.

**Microscopia.** Spore subglobose, tubercolate, di 3.9-4.3 x 3.0-3.3  $\mu$ ; basidi lungamente clavati, tetrasporici, con presenza di GaF, fino a 25.5-28.0 x 4.7-6.4  $\mu$ .