FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

**SCHEDA N° 0443 AMS_PD**

**ORDINE Boletales**

| | | | |
|---|---|---|---|
| GENERE **Boletus** | SPECIE **parasiticus** | AUTORE **Bull.** | |
| DATA DI RACCOLTA **16.09.2016** | LUOGO DI RACC. **Viola** | COMUNE **Ceva** | PROV. **CN** |
| ALTITUDINE S.L.M. **500 m** | I.G.M. **228-IV** | RACCOGLITORE **Marco Sandri** | |

**HABITAT:**

☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : **Castagno (prevalente)** ☒ RADO ☐ FITTO

☒ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☐ SU LEGNO ☐ VIVO ☐ MORTO DI

**ESPOSIZIONE:** ☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO** ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **Castagno.**

NOTE : **Rinvenuti più gruppetti di esemplari parassitanti Scleroderma citrinum.**

MICROSCOPIA: **Spore ellittico-fusiformi, guttulate, lisce, 11.6-13.9 x 3.9-5.0 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **GALLI R. - I BOLETI - EDINATURA**

DETERMINATORE **Marco Sandri**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI



SPORE

**DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)**

**Pileo** emisferico, di c.a. 1 cm. di diametro nell'esemplare più grande; cuticola tomentosa, colore giallo-bruno.

**Imenio** a tuboli decorrenti di colore giallo, pori abbastanza grandi di colore giallo oliva.

**Stipite** di colore giallastro, lungo circa 0.5-1 cm, pieno, leggermente incurvato, più sottile alla base.

**Carne** carne soda, sprovvista di odore e sapore.

**Microscopia**. Spore ellittico-fusiformi, guttulate, lisce, a parete spessa, con depressione preilare, di 11.6-(12.83)-13.9 x 3.9-(4.64)-5.0 µ, con Q: 2.67-(2.77)-2.98.

Nome corrente secondo Index fungorum: *Pseudoboletus parasiticus* (Bull.) Šutara 1991