



SCHEDA N° 0477 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Clitocybe	SPECIE phaeophthalma	AUTORE (Pers.) Kuyper
DATA DI RACCOLTA 09.11.2019	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S.Anna di Ghioggia PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Carlo Montagna
HABITAT:		
☐ PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Latifoglie miste (Quer	ce, Robinia, Pioppo)	⊠ RADO ☐ FITTO
DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
SU LEGNO	□ vivo □ morto	DI
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMBI	ROSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO	O M UMIDO ASCIUTTO SECCO
Note: Rinvenuta una decina di	esemplari in prossimità di un sentiero	
MICROSCOPIA: Spore da ellissoida	ali a pruniformi, lisce, 4.6-6.3 x 3.3-4.3	μ.
BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAI	PETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNG	GHI D'ITALIA (3) – A.M.B.
DETERMINATORE Carlo Montagna	a	
	RILIEVI EFFET	TUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI
CARPOFORI	SPORE	BASIDIOLI





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo depresso e (talora) ombelicato, di circa 4 cm di diametro nell'esemplare più grande; cuticola liscia, leggermente pruinosa, igrofana, di colore crema pallido, più scuro nella zona centrale; margine sottile, inizialmente involuto, con andamento ondulato-lobato.

Imenoforo a lamelle spaziate, decorrenti; biancastre sfumate di crema.

Stipite cilindrico, di colore crema-biancastro, più scuro nella parte inferiore, un po' fibrilloso; presente alla base residui miceliari biancastri.

Carne biancastra, igrofana; forte odore sgradevole.

Microscopia. Spore da ellissoidali a pruniformi, lisce, ialine, di 4.6-(5.1)- 6.3×3.3 -(3.76)- 4.3μ , con Q: 1.2-(1.36)-1.46; basidi lungamente clavati, tetrasporici, con GaF; ife dell' epicute cilindriche, inglobanti cellule subsferiche o largamente fusiformi.