FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0422 AMS_PD | **ORDINE Polyporales**

GENERE **Fistulina**	SPECIE **hepatica**	AUTORE **(Schaeff.) With.**	
DATA DI RACCOLTA **22.09.2017**	LUOGO DI RACC. **Parco**	COMUNE **Battaglia Terme**	PROV. **PD**
ALTITUDINE S.L.M. **15 m**	I.G.M. **147-III**	RACCOGLITORE **Vitaliano Milanese**	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☒ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : ☐ RADO ☐ FITTO

☐ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☒ SU LEGNO ☒ VIVO ☐ MORTO DI **Tasso e Quercia**

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **Quercia e Tasso (prevalente).**

NOTE : **Rinvenuti 2 esemplari: il primo alla base di un Tasso, il secondo su radice affiorante di Quercia.**

MICROSCOPIA: **Spore da ellissoidali a ovoidali, lisce, guttulate, 4.2-5.1 x 3.1-3.6 µ.**

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2)

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORO

CARPOFORO (IMENIO)



SPORE



IFE IMENIALI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Carpoforo reniforme con disposizione a mensola, di c.a. 8-10 cm di ampiezza massima; cuticola corrugato-verrucosa, di colore rosso fegato, più chiara nella regione perimetrale e in prossimità del gambo.

Imenoforo a tuboli cilindrici, piuttosto brevi, di colore rosa carne; pori molto piccoli, biancastri, ma di colore bruno-rossastro slavato alla pressione.

Stipite laterale, tozzo e relativamente corto, ma profondamente infisso nel supporto legnoso; concolore alla cuticola (in un esemplare leggermente più chiaro).

Carne elastica, spessa, succosa, di colore rosso vinoso, secernente un liquido rosso sangue; sapore lievemente acidulo, odore leggero.

Microscopia. Spore da ellissoidali a irregolarmente ovoidali, lisce, ialine, guttulate, di 4.2-(4.54)-5.1 x 3.1-(3.38)-3.6 µ, con Q: 1.14-(1.35)-1.47; basidi tetrasporici; ife tubolari agglutinate, disposte parallelamente, prive di GaF, con diametro 3.5-5.6 µ,