FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0467 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Hypholoma	SPECIE fasciculare	AUTORE (Huds.) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 13.09.2019	LUOGO DI RACC. Val di Sella	COMUNE Borgo Valsugana	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1100 m	I.G.M. 061-III	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : Misto di Faggio (prevalente) e Abete rosso e bianco ☒ RADO ☐ FITTO

☐ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☒ SU LEGNO ☐ VIVO ☐ MORTO DI

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti 5 cespi di esemplari fascicolati alla base di un tronco.

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a amigdaliformi, con poro germinativo, a parete spessa, 5.9-7.3 x 3.8-4.7 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B. (TRENTO)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI



SPORE

BASIDI



CISTIDI



EPICUTE



EPICUTE (GAF)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da emisferico a campanulato, di 3-5 cm di diametro, con ampio ambone ottuso; liscio, glabro, di colore giallo aranciato, più scuro (bruniccio) al disco; orlo sottile, appendicolato da residui velari.

Lamelle per lo più adnate, fitte, con lamellule; di colore giallo-verdastro pallido; filo intero.

Stipite cilindraceo, incurvato alla base; colore giallastro, con screziature brune nella parte inferiore; tracce di residui velari nerastri.

Microscopia. Spore da ellissoidali a amigdaliformi, con poro germinativo, a parete spessa, di 5.9-(6.68)-7.3 x 3.8-(4.29)-4.7 µ, con Q: 1.42-(1.56)-1.71; basidi cilindriformi, tetrasporici, di c.a. 19.0 x 5.6 µ; cistidi ventricosi o lageniformi, 21.7-31.8 x 8.3-11.6 µ; ife della cuticola esterna allungate e parallele, ife profonde più corte e larghe, talora incrostate e con presenza di GaF.