FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0441 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Lyophyllum	SPECIE connatum	AUTORE (Schumach.) Singer	
DATA DI RACCOLTA 06.09.2007	LUOGO DI RACC. Tonadico	COMUNE Tonadico	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1100 m	I.G.M. 062-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☒ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : Aghifoglia (prevalente) misto a latifoglia. ☐ RADO ☐ FITTO

☐ DENTRO AL BOSCO ☒ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☐ SU LEGNO ☐ VIVO ☐ MORTO DI

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti numerosi esemplar connatii in gruppi cespitosi, tra l'erba, ai margini di un sentiero.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, guttulate, 6.4-7.2 x 4.0-4.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C. CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B.

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI



SPORE



BASIDI (SIDEROFILI)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da emisferico a pulvinato, di circa 4 cm di diametro negli esemplari più grandi; cuticola opaca, liscia, sericea, biancastra con sfumature creama-grigiastre; orlo pileale piuttosto involuto, acuto e leggermente flessuoso.

Imenio a lamelle adnate o subdecorrenti, biancastre (funghi giovani).

Stipite cilindrico (talora allargato alla base), spesso compresso; fibrilloso-rugoloso, biancastro.

Carne bianca, soda; sapore neutro, odore spiccato.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, con numerose piccole guttule, di 6.4-(6.84)-7.2 x 4.0-(4.21)-4.6 µ, con Q: 1.56-(1.63)-1.72; basidi lungamente e strettamente clavati, siderofili (carminio acetico), 30.0-38.0 x 5.5-6.5 µ.