FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

SCHEDA N° 0469 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Lyophyllum	SPECIE rhopolopodium	AUTORE Clémençon	
DATA DI RACCOLTA 21.09.2019	LUOGO DI RACC. Val di Sella	COMUNE Borgo Valsugana	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 900 m	I.G.M. 061-III	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI ☐ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☒ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : Latifoglia (prevalente Faggio) misto a conifera ☐ RADO ☐ FITTO

☒ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☒ IN RADURE

☐ SU LEGNO ☐ VIVO ☐ MORTO DI

ESPOSIZIONE: ☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti tre esemplari vicini, tra l'erba di una schiarita.

MICROSCOPIA: Spore triangolari, ialine, talora con evidente guttula centrale, 6.9-8.4 x 5.9-6.7 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G.,PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (3) – A.M.B.

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI



SPORE



BASIDI (SIDEROFILI)



EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo convesso, di circa 3-4 cm di diametro; cuticola opaca, fibrillosa, grigio topo, più scura al disco, debolmente annerente al tocco; orlo un po' involuto, leggermente flessuoso.

Imenio a lamelle adnate o poco smarginate, con lamellule, bianco-grigiastre, prima grigio-glauco quindi lentamente annerenti alla manipolazione; filo lamellare irregolare.

Stipite cilindrico ma arrotondato-clavato alla base, un po' radicante; fibrilloso, longitudinalmente rugoloso, biancastro, annerente al tocco.

Carne bianca, soda (specie nel gambo), annerente lentamente all'aria; odore leggermente farinaceo.

Microscopia. Spore triangolari, ialine, spesso con grande guttula centrale, di 6.9-(7.62)-8.4 x 5.9-(6.35)-6.7 µ, con Q: 1.07-(1.20)-1.39; basidi clavati, tetrasporici, siderofili (carminio acetico), di c.a. 32.0-35.0 x 10.0-11.0 µ; epicute costituita da ife cilindriche, intrecciate o fascicolate, a terminali arrotondati, frequenti GaF.