

SCHEDA N° 0728 AMS_PD

ORDINE Agaricales

GENERE Agaricus	SPECIE bisporus	AUTORE (J.E. Lange) Imbach	
DATA DI RACCOLTA 22.06.2020	LUOGO DI RACC. Tonadico	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 750 m	I.G.M. 062-I	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :




NOTE : Rinvenuti ai margini di una strada su un tappeto erboso.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali di dimensione 6.5-7.4 x 4.5-5.4 µm.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (3)

DETERMINATORE **Franco Manganelli**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p style="text-align: center;">CARPOFORI</p>	 <p style="text-align: center;">SPORE</p>	 <p style="text-align: center;">SPORE</p>
 <p style="text-align: center;">BASIDI</p>		

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 5-6 cm di diametro, emisferico, con orlo decisamente incurvato; colore grigio biancastro, fuori dal disco dissociato in squame triangolari su fondo bianco.

Lamelle abbastanza fitte, larghe, inizialmente biancastre poi rosate con filo chiaro.

Gambo cilindrico, poi allargato verso la base, che può presentarsi fino a quasi bulbosa; anello fibrilloso, biancastro, spesso triangolare alla sezione, né supero né infero ma intermedio.

Carne soda, bianca, debolmente rosa-rosso al taglio; odore debole, fungino, sapore dolce.

Microscopia. Spore ellissoidali di dimensione 6.5-7.4 x 4.5-5.4 μm ; basidi per lo più bisporici.

Nota. Negli esemplari analizzati sono stati rinvenuti anche basidi mono- e tri-sporici.