



SCHEDA N° 0626 AMS_PD

ORDINE Amanitales

GENERE Amanita	SPECIE fulva	AUTORE Fr.	
DATA DI RACCOLTA 12.08.2020	LUOGO DI RACC. Laghetti del Venda	COMUNE Teolo	Prov. PD
ALTITUDINE S.L.M. 400 m	I.G.M. 047-IV	RACCOGLITORE Franco Manganell	i
HABITAT:			
☐ PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA	
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO	
BOSCO DI: Latifoglia (Castagno,	Quercia)	⊠ RADO □ F	ІТТО
DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI	
ESPOSIZIONE:	⊠ ASSOLATA □ OMBR	OSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO	UMIDO ASCIUTTO	SECCO
Note: Rinvenuta su residui organici, dentro una ceppaia di Castagno.			
MICROSCOPIA: Spore subglobose	, ialine, non amiloidi, 9.1-11.8 x 8.1-11.0) μ.	
BIBLIOGRAFIA: GALLI R. – LE AN			
Courtecuisse R.	, DOHEM B. – CHAMPIGNONS DE FRANCE	ET D'EUROPE	
DETERMINATORE Franco Manga	nelli RILIEVI EFFETT	UATI SU REPERTI X FRESCHI	SECCHI
CARPOFORI	Spore	SPORE	





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello di 4-5 cm di diametro, campanulato-convesso, poi quasi spianato, con un leggero ambone; colore fulvo-castano, più scuro verso il disco; decisamente scanalato verso il bordo, dove si presenta quasi crema.

Lamelle non fitte, libere al gambo, con presenza di lamellule; colore bianco, con tagliente intero e concolore.

Gambo slanciato, attenuato verso l'alto, biancastro o crema, finemente pruinoso e sfumato di bruno-fulvastro; velo parziale (**anello**) praticamente assente; velo generale (**volva**) poco inguainante, libero al gambo, molto fragile e con la parte esterna bianca.

Carne con sapore e odore non significativi.

Microscopia. Spore subglobose, ialine, non amiloidi, di 9.1-(10.27)- 11.8×8.1 -(9.35)- 11.0μ , con Q: 1.01-(1.11)-1.27. Polvere sporale biancastra.