

SCHEDA N° 0708 AMS_PD
ORDINE Amanitales

GENERE Amanita	SPECIE phalloides	AUTORE (Vaill. ex Fr.) Link	
DATA DI RACCOLTA 02.08.2022	LUOGO DI RACC. Val Uneda	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 850 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Numerosi cespugli di Nocciolo e altre latifoglie.

NOTE : Rinvenuti diversi esemplari.





MICROSCOPIA: Spore da largamente ellissoidali a subglobose, 7.0-9.7 x 5.5-6.6 µm.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORO

CARPOFORO

SPORE

BASIDI E BASIDIOLI

BASIDI

SPORE (AMILOIDIA)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello di 5-6 cm di diametro, emisferico campanulato, percorso da fibrille radiali (aspetto satinato), di colore verdastro, giallo-grigio-verdastro, con orlo più chiaro e liscio.

Lamelle libere, quasi ventricose, fitte e sottili, bianche.

Gambo attenuato in alto, decorato da bande a zig-zag di colore giallo olivastro su fondo bianco. Volva a sacco, membranacea, aderente ma libera all'orlo. Anello alto, a gonnellino, bianco, ±persistente.

Carne appena sfumata di verdastro e bianca, prima soda, poi molliccia; quasi inodore in gioventù, poi sgradevole.

Microscopia. Spore da largamente ellissoidali a subglobose, lisce, amiloidi, di 7.0-(8.18)-9.7 x 5.5-(6.04)-6.6 µm. Polvere sporale bianca.