

SCHEDA N° 0779 AMS_PD

ORDINE **Cantharellales**

GENERE Cantharellus	SPECIE cibarius	AUTORE Fr. 1821	
DATA DI RACCOLTA 24.07.2023	LUOGO DI RACC. Passo Cereda	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1100 m	I.G.M. 045-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<input type="checkbox"/> BOSCO DI: Abete Rosso e Bianco e qualche Faggio		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :


NOTE :

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, a contenuto granulare, 7.3-8.4 x 4.2-5.3 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) –A.M.B.

DETERMINATORE **Franco Manganelli**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello da adulto disteso-pulvinato, infine spianato-depresso, imbutiforme con orlo involuto; spesso lobato, liscio, di colore arancio-albicocca, con tempo secco leggermente impallidente.

Imenoforo di pseudolamelle decorrenti e fortemente intervenate; strette e spesse e con orlo ottuso, quasi concolori al cappello.

Gambo quasi cilindrico con una leggera svasatura sottole lamelle e verso la base, concolore o quasi al cappello.

Carne bianca, con sfumature periferiche giallastre; soda ed abbondante nel cappello, fibrosa nel gambo, di odore caratteristico e molto gradevole (come di albicocca) e di sapore mite.

Spore ellissoidali, lisce, a contenuto granulare, $7.3-8.4 \times 4.2-5.3 \mu$, con Q: 1.44-1.83; basidi tetrasporici, lungamente clavati, presenti GaF alla base; ife dell'epicute con giunti dotati di GaF.