



SCHEDA N° 0659 AMS_PD

_		_
ODDINE	Agarical	OC
CORDINE.	Agairca	1.5

GENERE Coprinellus	SPECIE saccharinus	AUTORE (Romagn.) R	oux, García, Dumas
DATA DI RACCOLTA 17.11.2021	LUOGO DI RACC. San Lazzaro	COMUNE Padova	Prov. PD
ALTITUDINE S.L.M. 13 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Vitaliano N	Milanese
HABITAT: PRATI ERBOSI TERRENO NUDO TORBIERA	 ☑ ORTI E GIARDINI ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ TERRENO COLTIVATO A 	☐ MARGINI DI STRAD	A
ARGINE DI FIUME BOSCO DI:	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO	☐ FITTO
□ DENTRO AL BOSCO □ SU LEGNO ESPOSIZIONE:	☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ VIVO ☐ MORTO ☐ ASSOLATA ☐ C	☐ IN RADURE DI ☐ MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO U		o SECCO
Note: Rinvenuti gruppi di esen	nplari tra l'erba in prossimità di ce	spugli.	
MICROSCOPIA: Spore da ellissoid	ali a faseoliformi (mitraliche), gutt	ulate, poro germinativo centrale, 7.2	2-9.8 x 4.5-6.2 μ.
DETERMINATORE Vitaliano Milar	RILIEVIEF	FETTUATI SU REPERTI FRESCHI	□ SECCHI BASIDI
CARPOFORI	SPORE		





DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da cilindrico-ovoidale a cilindrico-campanulato, con ambone, di circa 2 cm di diametro (fino a 4-5 cm aperto); solcato per tutta l'estensione, di colore bruno-ocraceo, bruno al disco, ricoperto da rade fioccosità biancastre di velo (esemplari anziani).

Lamelle strettamente adnate, fitte; inizialmente biancastre, mantengono a lungo il filo chiaro.

Stipite cilindrico, liscio; di colore biancastro, sericeo, imbrunente alla base.

Carne esigua, senza odore particolare.

Microscopia. Spore da ellissoidali a faseoliformi (in pochi casi mitraliche), guttulate, con poro germinativo centrale, di 7.2-(8.42)-9.8 x 4.5-(5.26)-6.2 μ , con Q: 1.37-(1.6)-1.81; basidi tetrasporici; cistidi largamente cilindrico-ellissoidali, 98-140 x 55-65 μ ; corteccia stipitale liscia con rade sete; velo granulare, labile, costituito da ife subsferiche.