

SCHEDA N° 0638 AMS_PD
ORDINE Agaricales

GENERE Coprinellus	SPECIE xanthothrix	AUTORE (Romag.) Vilgal., Hopple & al.	
DATA DI RACCOLTA 10.06.2021	LUOGO DI RACC. Posina	COMUNE Posina	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 650 m	I.G.M. 102-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Latifoglie miste		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti due esemplari tra l'erba, lungo un sentiero.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, con ampio poro germinativo centrale, 6.3-8.0 x 4.4-5.3 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (4)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

VELO

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da cilindrico-ovoidale (esemplari giovani), di c.a. 12 mm di diametro; solcato e plissettato per tutta l'estensione, di colore grigio-ocraceo, con disco brunastro, ricoperto da fioccosità biancastre di velo.

Lamelle strettamente adnate, inizialmente da biancastre a grigiastre.

Stipite cilindrico, allargato alla base; di colore biancastro, con fibrille sericee lungo tutta la sua estensione.

Carne esigua, senza odore particolare.

Microscopia. Spore ellissoidali o (in minor misura) faseoliformi, con ampio poro germinativo centrale, di $6.3-(7.45)-8.0 \times 4.4-(4.9)-5.3 \mu$, con Q: 1.35-(1.52)-1.65; basidi tetrasporici; velo costituito da elementi sferici o ellissoidali catenulati.