

SCHEDA N° 0573 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE atrocoeruleus	AUTORE M.M. Moser	
DATA DI RACCOLTA 16.08.2020	LUOGO DI RACC. Passo Pinei	COMUNE Castelrotto	PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 027-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Esemplari rinvenuti sul bordo di un sentiero in prossimità di rivo d'acqua.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, debolmente verrucose, 7.5-9.0 x 4.7-5.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : MOSER M. – GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DI FUNGHI

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

CISTIDI

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo convesso-umbonato, di circa 4 cm di diametro nell'esemplare più grande; cuticola satinata, di colore bruno-nerastro (più scuro negli esemplari giovani), con rivestimento bianco-lanoso sul bordo.

Lamelle adnato-smarginate, intercalate da lamellule; di colore bruno caffelatte; ventricose, con filo debolmente eroso.

Stipite subcilindrico, relativamente sodo; di colore biancastro, con rivestimento (armilla) brunastro nella parte inferiore.

Carne fibrosa, chiara ma imbrunente nella regione basale; odori non rilevati.

Microscopia. Spore ellissoidali, apicolate, debolmente verrucose, di $7.5-(7.8)-9.0 \times 4.7-(5.17)-5.6 \mu$, con Q: $1.34-(1.51)-1.65$; basidi tetrasporici; cistidi cilindrico-clavati, $11.0-14.6 \times 6.0-7.8 \mu$; ife dell'epicute (strato esterno) cilindriche, $50.7-64.0 \times 13.5-15.0 \mu$; ife dello strato interno più corte e ventricose, $39-48 \times 16.5-20.0 \mu$, in entrambi i casi con pigmento incrostante; presenti GaF.