

SCHEDA N° 0666 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE candelaris	AUTORE Fr.	
DATA DI RACCOLTA 05.11.2021	LUOGO DIRACC. Bosco dell'Orna	COMUNE Coredò	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 700 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Misto Aghifoglia e Latifoglia a carattere termofilo		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Tappeto di Erica.



NOTE: Rinvenuti quattro esemplari gregari in avvallamento umido con esposizione a Nord.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, verrucose, 8.4-10.2 x 5.3-6.5 µ.

BIBLIOGRAFIA: BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI [GAF]

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da campanulato a convesso, di circa 4 cm di diametro nell'esemplare più grande; cuticola liscia, igrofana, colore da bruno-rossastro a ocre ± chiaro; bordo sottile, acuto, fibrillato e fessurato.

Lamelle adnate o debolmente decorrenti, intercalate a lamellule; di color bruno-cannella, con margine irregolare, con tratti biancastri.

Stipite subcilindrico, leggermente ingrossato alla base, un po' radicante; con (spesso) striature longitudinali concolori al cappello su base crema.

Carne bianco-crema con striature brune, piuttosto fibrosa; odore e sapore sgradevoli.

Microscopia. Spore ellissoidali, verrucose, di $8.4-(8.86)-10.2 \times 5.3-(5.72)-6.5 \mu$, con Q: 1.39-(1.51)-1.86; basidi cilindrico-clavati, tetrasporici, $35.0-40.0 \times 7.5-9.0 \mu$, dotati di GaF.

Nota. Secondo ISF: *C. candelaris* = *C. duracinus*