

SCHEDA N° 0776 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE chevassutii	AUTORE Rob. Henry 1982	
DATA DI RACCOLTA 13.11.2023	LUOGO DI RACC. Monti Berici	COMUNE	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 300 m	I.G.M. 082-III	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Latifoglie miste (Quercia, Carpino prevalenti)		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti tre esemplari vicini.


MICROSCOPIA: Spore da ellittiche a subamigdaliformi, 8.3-9.6 x 4.8-5.9 µ.

BIBLIOGRAFIA : CALLEDDA F., CAMPO E. & AA – GUIDA INTRODUTTIVA AL GENERE CORTINARIUS IN EUROPA

DETERMINATORE Franco Fratta

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SEZIONE

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello da emisferico ad appiattito, con basso umbone; cuticola liscia, di colore ocraceo, con fasci di fibrille brunastre (specie al margine); margine convesso.

Lamelle non particolarmente fitte, con lamellule; di color ruggine, con filo regolare, più chiaro.

Gambo cilindrico, con bulbo evidente; biancastro, con striature brunastre a partire dalla base.

Carne biancastra; sapore non significativo, odore debole.

Microscopia. Spore da ellittiche a subamigdaliformi, verrucose, di $8.3-(8.98)-9.6 \times 4.8-(5.5)-5.9 \mu$, con Q: $1.45-(1.67)-2.01$; basidi clavati, tetrasporici.