

SCHEDA N° 0629 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE claricolor var. immissus	AUTORE (Schläpf.-Bernh.) Nezdajm.	
DATA DI RACCOLTA 04.10.2019	LUOGO DI RACC. Arnica	COMUNE Castelfondo	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abeti e qualche Nocciolo		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti tra il muschio umido in un pianoro con esposizione a Est.

MICROSCOPIA: Spore amigdaliformi, verrucose, 7.5-8.9 x 4.5-5.2 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (3)

DETERMINATORE Giorgio Bortoletto

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da globoso a piano convesso, di circa 5 cm di diametro negli esemplari maggiori; cuticola liscia, leggermente viscosa, finemente fibrillosa, di colore bruno-rossatro-arancione; orlo involuto, (talora) con residui di cortina.

Lamelle situato-adnate, di colore iniziale bianco-lilla.

Stipite cilindrico, allargato verso la base, fibrilloso; biancastro con cortina bianca evidente.

Microscopia. Spore amigdaliformi, verrucose, di 7.5-(8.06)-8.9 x 4.5-(4.96)-5.2 μ , con Q: 1.47-(1.63)-1.85; cellule terminali da cilindriche a subclavate.

Nome corrente: *C. immissus*