

SCHEDA N° 0634 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE crassus	AUTORE Fr.	
DATA DI RACCOLTA 13.09.2020	LUOGO DIRACC. Vodo di Cadore	COMUNE Vodo di Cadore	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1500 m	I.G.M. 029-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso e qualche Betulla		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti 5-6 esemplari molto vicini.

MICROSCOPIA: Spore da ellisoido-amigdaliformi a fusiformi, debolmente verrucose, 6.4-8.8 x 4.4-5.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

TERMINALI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da emisferico a convesso, con margine involuto, di circa 5-6 cm di diametro negli esemplari più grandi; cuticola asciutta, non igrofana, di colore bruno-ocraceo, con macule più scure sul bordo, tracce di cortina biancastra al margine.

Lamelle largamente annesse, per lo più ventricose nella zone iniziale, alternate a lamellule, di colore ocra argilla; filo irregolare (dentellato), biancastro.

Stipite cilindrico, obclavato, leggermente radicante; biancastro, con sfumature ocracee; bulbo ricoperto da micelio biancastro.

Carne piuttosto soda, biancastra, con sfumature debolmente ocracee; sapore neutro, odore non significativo.

Microscopia. Spore da ellisoido-amigdaliformi a fusiformi, debolmente verrucose, di 6.4-(7.14)-8.8 x 4.4-(4.84)-5.6 μ , con Q: 1.26-(1.47)-1.64; basidi clavati, tetrasporici.