

SCHEDA N° 0707 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE diffractosuavis	AUTORE Chevassut & Rob. Henry	
DATA DI RACCOLTA 20.10.2022	LUOGO DI RACC. Contrada Bonati	COMUNE Schio	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 450 m	I.G.M. 104-IV	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Latifoglie (Quercia prevalente, Carpino, Robinia)		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti 6-7 esemplari relativamente vicini.

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a ovoidali, verruche marcate e parzialmente connesse, 10.1-12.8 x 6.1-8.2 µ.

BIBLIOGRAFIA : CALLEDDA F., CAMPO E., FLORIANI M., MAZZA R. – GUIDA AL GENERE CORTINARIUS IN EUROPA

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da emisferico ad appianato, di 5 cm di diametro nell'esemplare più grande; cuticola asciutta, fibrillosa, screpolata in areole negli esemplari più anziani, di colore ocraceo, più chiaro al margine, dove presenta residui velari.

Lamelle smarginate, con lamellule, di colore ocraceo; filo eroso, biancastro.

Stipite cilindrico, ingrossato alla base; biancastro, bruno-giallastro nella regione inferiore, velo chiaro aderente, con bordatura anulare.

Carne grigiastra, imbrunente nella parte basale; odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore da irregolarmente ellissoidali a ovoidali, con verruche marcate e parzialmente connesse, di 10.1-(10.98)-12.8 x 6.1-(6.43)-8.2 μ , con Q: 1.44-1.89; basidi clavati, tetrasporici.