

SCHEDA N° 0640 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE lividoochraceus	AUTORE (Berk.) Berk.	
DATA DI RACCOLTA 13.09.2020	LUOGO DI RACC. Vodo di Cadore	COMUNE Vodo di Cadore	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1400 m	I.G.M. 029-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso e Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti 2 esemplari vicini.

MICROSCOPIA: Spore da amigdaliformi a citriformi, 12.2-13.8 x 6.8-7.9 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G. ANTONINI A., ANTONINI M. – IL GENERE CORTINARIUS IN ITALIA (E)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello di 4-5 cm di diametro negli esemplari più grandi, da campanulato a piano convesso con ampio umbone; viscido, di colore ocre pallido.

Lamelle smarginate, spaziate, intercalate a lamellule; color crema, con filo eroso, biancastro.

Gambo cilindrico, lievemente ingrossato alla base, un po' radicante; biancastro, un debolmente striato all'apice, poco viscido (tempo secco).

Carne biancastra, piuttosto cedevole; odore vagamente mielato.

Microscopia. Spore da amigdaliformi a citriformi, verrucose, di 12.2-(12.92)-13.8 x 6.8-(7.52)-7.9 μ , con Q: 1.59-(1.72)-1.81; basidi clavati, tetrasporici.