

SCHEDA N° 0684 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE orellanoides	AUTORE Henry	
DATA DI RACCOLTA 12.07.2021	LUOGO DI RACC. Monte Bedolè	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 950 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<input type="checkbox"/> BOSCO DI: Abete rosso e Larici		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **Sotto Abete rosso, su lettiera di aghi e muschio.**

NOTE : **Rinvenuti diversi esemplari.**

MICROSCOPIA: **Spore da ellissoidali a subglobose, debolmente verrucose, 8.8-10.9 x 6.9-8.5 µ.**

BIBLIOGRAFIA : **PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B. (TN)
BREITENBACH J., KRANZLIN F. – CHAMPIGNONS DE SUISSE (5)**

DETERMINATORE **Franco Manganelli**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




CARPOFORI




CARPOFORO




TEST ORELLANINA



SPORE



SPORE



BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello da conico campanulato a disteso con evidente umbone acuto, di 4-5 cm di diametro; cuticola opaca ed asciutta, di colore bruno rossiccio aranciato, densamente coperta da fibrille squamulose con colori.

Lamelle smarginato-uncinate, concolori al cappello o più rossicce, con filo intero concolore.

Gambo quasi cilindrico o leggermente allargato alla base, concolore al cappello ed ornato da bande giallastre più o meno evidenti.

Carne soda, giallo arancio più rossiccia verso la base del gambo; odore rafanoide appena percettibile.

Microscopia. Spore da ellissoidali a subglobose, punteggiate da numerose e piccole verruche, di 8.8-(9.81)-10.9 x 6.9-(7.94)-8.5 μ ; sporata bruno ruggine.