

SCHEDA N° 0571 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE orichalceus	AUTORE (Batsch) Fr.	
DATA DI RACCOLTA 18.10.2020	LUOGO DI RACC. Arnica	COMUNE Castelfondo	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1250 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: Abete rosso e Nocciolo | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :



NOTE : Rinvenuti tre esemplari tra l'erba di una schiarita, in prossimità di una vasca d'acqua.

MICROSCOPIA: Spore amigdaliformi, verrucose, 8,7-12,3 x 6,0-7,0 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5)

DETERMINATORE Giorgio Bortoletto

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p style="text-align: center;">CARPOFORI</p>	 <p style="text-align: center;">SPORE</p>	 <p style="text-align: center;">BASIDI</p>

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da emisferico a convesso, di circa 6-7 cm di diametro; cuticola vischiosa, di colore bruno-rossastro, più scuro nella regione discale; margine regolare, con sfumature dal grigiastro al verde-olivaceo.

Lamelle adnate al gambo; di colore giallo verdastro.

Stipite cilindrico, di colore biancastro con sfumature verdoline; ampio bulbo marginato.

Carne biancastra, con sfumature verde-olivastro nella regione centrale del gambo; odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore amigdaliformi, verrucose, di 8.7-(11.01)-12.3 x 6.0-(6.51)-7.0 μ , con Q: 1.36-(1.65)-1.95; basidi clavati, tetrasporici, 34.5-36.0 x 8.5-9.0 μ .