

SCHEDA N° 0760 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE rufoallutus	AUTORE Rob. Henry 1958	
DATA DI RACCOLTA 08.10.2023	LUOGO DI RACC. Lavarone	COMUNE Lavarone	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 081-I	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| <input type="checkbox"/> BOSCO DI: Abete rosso (prevalente) e Faggio | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :


NOTE : Rinvenuti tre esemplari isolati prossimi.

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a subamigdaliformi, debolmente verrucose, 9.1-11.0 x 5.6-6.2 µ.

BIBLIOGRAFIA : CALLEDDA F. & AL. – GUIDA INTRODUTTIVA AL GENERE CORTINARIUS IN EUROPA

DETERMINATORE Franco Fratta

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p style="text-align: center;">CARPOFORI</p>	 <p style="text-align: center;">SPORE</p>	

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da emisferico a convesso; cuticola poco viscida, di colore bruno-aranciato, con fibrille irregolari e macule igrofane; resti di velo biancastro al margine.

Lamelle smarginate, con lamellule; colore da grigio chiaro a crema-ocraceo.

Stipite piuttosto tozzo, cilindrico, con bulbo marginato; superficie fibrillosa, biancastra ma debolmente imbrunente nella parte inferiore.

Carne biancastra, soda, con presenza di una linea bruna sotto la cuticola e sopra le lamelle; odore debole e sapore non significativo.

Microscopia. Spore da ellissoidali a subamigdaliformi, debolmente verrucose, di 9.1-(9.86)-11.0 x 5.6-(5.93)-6.2 μ , con Q : 1.46-(1.66)-1.82.