

SCHEDA N° 0572 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE subbalteatus	AUTORE Kühner	
DATA DI RACCOLTA 23.06.2020	LUOGO DI RACC. Arnica	COMUNE Castelfondo	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: **Abete rosso e Pino sp.**

- RADO FITTO
 IN RADURE

- | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----|--|
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO | DI | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----|--|

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Rinvenuto sul bordo di un sentiero prativo, ai bordi di un bosco umido di Abete e qualche Pino.**

MICROSCOPIA: **Spore amigdaliformi, debolmente verrucose, 9,3-10,8 x 5,4-6,1 µ.**


BIBLIOGRAFIA : **BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5)**

DETERMINATORE **Giorgio Bortoletto**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORI



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo da piano-convesso (fungo adulto), di circa 11 cm di diametro; cuticola asciutta (tempo secco), feltrata, di colore bruno-rossastro, con sfumature lilla al bordo.

Lamelle arrotondate al gambo, con lamellule; di colore grigio-brunastro, margine irregolare più chiaro.

Stipite cilindrico, subclavato, di colore biancastro con fibrilla longitudinali brunastre.

Carne biancastra, soda; odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore amigdaliformi, debolmente verrucose, di 9.3-(10.24)-10.8 x 5.4-(5.73)-6.1 μ , con Q: 1.67-(1.79)-1.93; basidi clavati, tetrasporici.