

SCHEDA N° 0664 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE triumphans	AUTORE Fr.	
DATA DI RACCOLTA 05.11.2021	LUOGO DI RACC. Bosco dell'Orna	COMUNE Coredo	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 750 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input checked="" type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: Misto Aghifoglia e Latifoglia a carattere termofilo | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Pino e Orniello con presenza di Betulla.



NOTE : Rinvenuti tre esemplari sul bordo di un sentiero con esposizione a Nord.

MICROSCOPIA: Spore da amigdaliformi a subcitriformi, debolmente verrucose, 11.3-13.9 x 7.2-8.5 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p>CARPOFORI</p>	 <p>SPORE</p>	 <p>EPICUTE</p>

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo piano con leggera depressione centrale (fungo adulto), di circa 8 cm di diametro; cuticola appena un po' viscosa (tempo secco), di colore giallo-ocraceo, bruno-rossastro al centro, liscia con squamette brunastre (specie al disco) residui del velo; bordo sottile.

Lamelle smarginate, con lamellule piuttosto lunghe, di colore iniziale biancastro, quindi ocraceo; filo eroso, più chiaro; tenui riflessi lilla-grigiastri.

Stipite cilindrico, subclavato, di colore biancastro; pruinoso nella regione apicale, ricoperto da bande brunastre al di sotto della zona anulare.

Carne soda, biancastra, giallo-ocracea con KOH; odore e sapore un po' dolciastri.

Microscopia. Spore da amigdaliformi a subcitriformi, debolmente verrucose, di 11.3-(12.73)-13.9 x 7.2-(7.75)-8.5 μ , con Q: 1.5-1.82; ife dell'epicute gelificate e dotate di GaF.