

SCHEDA N° 0567 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| GENERE Cortinarius | SPECIE variegatus | AUTORE Bres. | |
| DATA DI RACCOLTA 13.10.2019 | LUOGO DI RACC. Marmorara | COMUNE Castelfondo | PROV. TN |
| ALTITUDINE S.L.M. 1300 m | I.G.M. 026-III | RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto | |

HABITAT:

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: Abete rosso | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Crescita cespitosa, in costone rivolto a Nord.

MICROSCOPIA: Spore da subfusiformi a subamigdaliformi, appena verrucose, 6.2-7.8 x 3.0-4.0 µ.


BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATLANTE FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (3)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORI



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Pileo convesso, con basso e ampio umbone; cuticola liscia, di colore bruno-rossastro, più marcato al disco, con fibrille radiali più chiare; margine sottile, ondulato, con breve eccedenza di velo.

Lamelle leggermente smarginate, intercalate a lamellule; colore iniziale biancastro, con filo irregolare.

Stipite subcilindrico, appena un po' bulboso, di colore biancastro.

Carne biancastra, con odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore da subfusiformi a subamigdaliformi, appena verrucose, di 6.2-(6.87)-7.8 x 3.0-(3.45)-4.0 μ , con Q: 1.74-(1.99)-2.16.