

SCHEDA N° 0738 AMS_PD
ORDINE Pezizales

GENERE <i>Discina</i>	SPECIE <i>perlata</i>	AUTORE (Fr.) Fr.	
DATA DI RACCOLTA 17.04.2014	LUOGO DI RACC. Transacqua	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 800	I.G.M. 062-I	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti su ceppaia di Abete rosso ricoperta da muschio e molto degradata.


MICROSCOPIA: Spore ellissoidi, guttulate, 25.6-29.8 x 11.6-13.8 µm.

BIBLIOGRAFIA : MEDARDI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEGLI ASCOMICETI D'ITALIA

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

ASCOMI

ASCOMI

SPORE

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Ascoma sotto forma di apotecio di 0.75 cm di diametro, quasi tondeggianti; imenio lobato, con molte gibbosità, leggermente vellutato o quasi liscio, bruno-tabacco con qualche venosità; superficie esterna molto chiara (ocra molto pallido) con riflesso rosato.

Gambo lungo 3-4 mm, formata dal prolungamento delle venosità, con colore alla parte esterna del carpoforo.

Carne ceracea, molto fragile alla rottura, mostra i due colori (bruno-pallido); odore non osservato.

Microscopia. Spore ellissoidi, guttulate, 25.6-29.8 x 11.6-13.8 µm.