

SCHEDA N° 0757 AMS_PD

ORDINE Entomatales

GENERE Entoloma	SPECIE griseocyaneum	AUTORE (Fr.) P. Kumm. 1871	
DATA DI RACCOLTA 10.08.2023	LUOGO DI RACC. San Michele	COMUNE Castelrotto	PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 027-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTIE GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso (prevalente), Pinus sp.		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :


NOTE : Rinvenuti su un costone erboso, in prossimità di un sentiero.

MICROSCOPIA: Spore poligonali con 5-7 angoli, 9.7-12.2 x 7.0-8.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : NOORDELOOS M. E. – ENTOLOMA S.L. – FUNGI EUROPAEI

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p>CARPOFORI</p>	 <p>SPORE (5-9 ANGOLI)</p>	 <p>BASIDI</p>
 <p>IFE EPICUTE</p>		

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)

Cappello conico campanulato con leggera depressione centrale; cuticola fibrilloso-squamulosa, non striata, di colore bruno, più chiaro al margine; margine leggermente involuto.

Lamelle da smarginate ad adnate, poco fitte, alternate a lamellule; filo intero, ondulato, concolore.

Gambo cilindrico, di colore bluastro, con fibrillature longitudinali, più marcate nella regione apicale, brillante, base biancastra e feltrata.

Carne con odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore poligonali con 5-7 angoli, di 9.7-(10.73)-12.2 x 7.0-(7.69)-8.8 μ , con Q: 1.25-(1.4)-1.48; basidi clavati, tetrasporici; cistidi assenti; ife dell'epicute settate, con incrostazioni; GaF assenti in tutte le strutture.